

SIOMI
SOCIETÀ ITALIANA DI OMEOPATIA
MEDICINA INTEGRATA

VII Convegno Nazionale Triennale

Omeopatia, tra Medicina delle evidenze
e Medicina narrativa

**ARNICA: CASO CLINICO
DI EPILESSIA FELINA**

Dott. Bruno Cipollone
Medico Veterinario Omeopata
Responsabile Gruppo Veterinario SIOMI

Firenze 05/03/2016

LEILA MI PRESENTO

- Sono un gatto.....
- siamese
- Femmina
- Nata nel 2006
- Sterilizzata!!!
- Presa a 3 mesi a casa di colleghi
- Ultima della cucciolata familiare



Arrivo a Casa

PRIMA SETTIMANA IN CASA

- Non ci sono stati problemi particolari
- Cibo e bisognini tutto bene
- La gatta che viveva in casa da 13 anni mi ha accolto nei primi giorni con un po' di diffidenza poi non ci sono stati problemi
- Mi ha scelto la proprietaria Ella



COME SI RELAZIONE CON GLI ALTRI ANIMALI E PERSONE

- A parte la compagna fissa, ci sono state poche occasioni di incontrare altri animali.
- Qualche volta ci sono state visite di cani in casa, prontamente parcheggiati sul terrazzo con la porta chiusa.
- In queste occasioni sono molto vigile e capace di aggredire.
- Con gli sconosciuti è curiosa, ma si tiene a distanza, socievole con le persone che conosce.

**STORIA CLINICA e
COMPORIMENTALE**

- All'età di sei mesi LEILA sono caduta dal balcone del sesto piano.
- Mi sono fatta molto male (trauma cranico, contusione del fegato, pneumotorace, frattura delle zampe anteriori ed ha perso un canino) ho avuto due interventi chirurgici oltre a stare in clinica per una settimana.
- All'età di un anno ho cambiato casa.
- La mia compagna vecchia è morta quando avevo 3 anni.

**STORIA CLINICA e
COMPORIMENTALE**



- Dopo 2 mesi la proprietaria ha preso una nuova cucciola, (amica) all'inizio avevo difficoltà ad accettarla ma soprattutto attraverso il gioco abbiamo stabilito una relazione.

STORIA CLINICA e COMPORAMENTALE

SONNO

- E' normale
- Dorme durante il giorno in vari posti, la notte in fondo al letto con la compagna.
- Dopo il riposo si stiracchia

PAURE

- LEILA non è particolarmente paurosa, talvolta le danno fastidio i rumori forti.

SE FOSSE UNA SUA AMICA COME LA DEFINIREBBE: FEDELE

ALIMENTAZIONE

- Divora tutto ma il cibo non è sempre a disposizione viene somministrato ad orari regolari mattina e sera. Non riceve nulla dalla tavola mentre la proprietaria sta mangiando.
- **CIBI ODIATI** - Non è abituata a mangiare la carne e quindi la scarta
- **CIBI PREFERITI** – Pesce e crocchette
- Vuole bere da una ciotola posta in un'altra stanza distante da dove mangia il cibo a volte beve acqua corrente dal lavandino del bagno

LEILA - ARNICA

PAURE

- LEILA non è particolarmente paurosa, talvolta le danno fastidio i rumori forti.

SE FOSSE UNA SUA AMICA COME LA DEFINIREBBE:
FEDELE

MOTIVO DELLA VISITA

Mi è stata diagnosticata l'EPILESSIA mi sto curando con barbiturici, vorrei provare una terapia meno dannosa alla mia salute, che non mi dia problemi di intossicazione.

Qui non sembrerebbe ma vi assicuro che è stressante avere attacchi epilettici anche di breve durata.



EPILESSIA

- Inoltre epilessia non è sinonimo di convulsione: l'epilessia è infatti una sindrome caratterizzata dalla presenza di convulsioni ricorrenti non associate però a malattie intracraniche progressive.



Gatto epilettico al quinto giorno



Gatto epilettico

Cause di convulsioni nei gatti

Cause extracraniche

- Tossine
- Avvelenamenti (stricnina, metaldeide, idrocarburi clorurati, organo fosfati, piombo, glicole etilenico)
- Ipoglicemia
- Epatopatia
- Grave insufficienza renale con uremia
- Ipocalcemia
- Disturbi elettrolitici
- Iperlipoproteinemia

Cause di convulsioni nei gatti

Cause intracraniche

- Idrocefalo (raro)
- Lissencefalia
- Tumori (meningiomi nei gatti anziani)
- Processi infiammatori (infettivi, poliencfalomielite felina)
- Vasculopatie (infarti, emorragia, tromboembolismi, encefalopatia ischemica felina)
- Epilessia acquisita
- Carenza di tiamina
- Malattie da accumulo lisosomiale

EPILESSIA IDIOPATICA

Come abbiamo già detto, l'epilessia è una sindrome caratterizzata da convulsioni ricorrenti non associate però a una patologia intracranica progressiva. L'epilessia può essere provocata da un problema encefalico ereditario, nel qual caso si parla di epilessia primaria o idiopatica e essere il risultato di un trauma cerebrale che ha lasciato dietro di sé un danno, quindi un'epilessia acquisita.

EPILESSIA IDIOPATICA

L'epilessia acquisita può essere provocata da un pregresso processo infiammatorio, da un trauma, da un avvelenamento precedente, da un danno metabolico o vascolare: un gruppo di neuroni viene danneggiato ed ecco che partono da qui scariche elettriche improvvise che provocano le convulsioni. L'epilessia acquisita si può manifestare nei gatti di qualsiasi razza, età e sesso. Il trauma che ha scatenato l'epilessia acquisita può risalire anche ad anni prima, non è necessariamente recente.

EPILESSIA IDIOPATICA

L'epilessia idiopatica è invece rara nel gatto, molto più frequente nel cane. Di solito nel gatto la causa è da ricercarsi in encefaliti o tumori. Fondamentalmente quando non si hanno cause dimostrabili che giustifichino le crisi convulsive, si parla di epilessia idiopatica.

EPILESSIA

Il gatto che si abbatte di lato, perdita di conoscenza, contrazioni tonico-cloniche dei muscoli, perdita di urina, di feci e scialorrea. La crisi convulsiva normalmente dura 1-5 minuti, la frequenza con cui si ripresentano è variabile da soggetto a soggetto. Nell'epilessia il gatto fra una crisi e l'altra è assolutamente normale.

LEILA - ARNICA

The screenshot shows a software window titled 'LEILA - ARNICA' with a grid of data points. The grid has columns labeled with numbers 1 through 24 and rows labeled with letters A through H. The data points are represented by small black squares, indicating specific events or measurements at those coordinates. The interface also includes various toolbars and menu options typical of a data analysis or monitoring software.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

- **CALCAREA** non scrofolosa non mai avuto problemi cutanei e ghiandolari, non è grassa (nonostante la sterilizzazione), freddolosa ma solo in inverno
- **SILICEA** è detto anche il rimedio per antonomasia dei gatti ma in questo caso la sensazione di freddo è solo in inverno non cerca luoghi caldi,

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

- **LACHESIS** anche se preferisce l'ambito casalingo è stata sempre in compagnia di un suo simile, non è molto loquace tende a farsi i fatti suoi quando viene il cane dell'amica la deve chiudere in una stanza, ma è socievole con le persone che conosce

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

- **ARNICA** rimedio elettivo di attacchi epilettici a seguito di incidenti con fratture, confermato dal voler essere lasciato da solo e preferisce stare in casa. Confermato dalle lesioni sia acute che croniche che ha avuto a seguito dell'incidente e dell'interventi chirurgici successivi.

LEILA - ARNICA

TERAPIA LEILA		
DATA	LUMINALE	ARNICA
19/03/2013	¼ cpr al di	30 ch 3 gr 1 volte al di
26/03/2013	¼ cpr al di	30 ch 3 gr 1 volte al di
02/04/2013	¼ cpr al di	30 ch 3 gr 1 volte al di
09/04/2013	¼ cpr al di	30 ch 3 gr 2 volte al di
16/04/2013	¼ cpr ogni 2 giorni	30 ch 3 gr 2 volte al di
23/04/2013	¼ cpr ogni 2 giorni	30 ch 3 gr 3 volte al di
07/05/2013	¼ cpr 2 volte a settimana	30 ch 3 gr 3 volte al di
14/05/2013	¼ cpr 2 volte a settimana	200 ch 1 tubo monodose al di
21/05/2013	¼ cpr 1 volta a settimana	200 ch 1 tubo monodose al di
30/05/2013	¼ cpr 1 volta a settimana	200 ch 1 tubo ogni 2 giorni
04/06/2013	¼ cpr 1 volta ogni 2 settimane	200 ch 1 tubo ogni 2 giorni
11/06/2013	¼ cpr 1 volta ogni 2 settimane	200 ch 1 tubo ogni 3 giorni
19/06/2013	¼ cpr 1 volta al mese	200 ch 1 tubo ogni 3 giorni
25/06/2013	¼ cpr 1 volta al mese	200 ch 1 tubo ogni 3 giorni
02/07/2013		200 ch 1 tubo ogni settimana

CONCLUSIONI

- **TERAPIA INTEGRATA**
 - Gestione del processo e delle tappe terapeutiche
 - Gestione del paziente e del proprietario
 - Controllo attento dell'evoluzione della terapia
 - Valorizzazione dei rilievi effettuati da proprietario con successiva valutazione.

CONCLUSIONI

- **TERAPIA OMEOPATICA**
 - Tre anni di follow-up
 - Controlli semestrali primo anno annuali successivamente
 - Rivalutazione del caso in presenza di nuovi sintomi
 - Riduzione notevole delle spese terapeutiche
 - Riduzioneaimè..... delle **spese veterinarie**

